○アシボソについて（檜山庫三） Kōzō HIYAMA: On *Pollinia japonica* var. *polystachya* Fr. et Sav.

アシボソの稈は通常は無毛であるが，たまに開出したやや長めのごく細い毛を有するものがある。この場合，毛は花穂下の稈の梢部ではやや多生し，それより下に次第に疎となり，下半部では無毛となる。このものは 1957 年 11 月 24 日に栃木県足利郡行道山で松沢篤郎氏が採集されたもので，これにウスゲアシボソの名を与える。さて，その学名であるが，*Pollinia japonica* var. *polystachya* Fr. et Sav. というものは，observation によれば "épis le plus souvent au nombre de 2, rarement 4, fasciculés au somment des chaumes qui sont un peu pubescents" とあるから，これは上に記したウスゲアシボソの型であると見てよいと思う。よって，*Microstegium vimineum* var. *polystachyum* Ohwi はその正しい学名ということになる。従って常品であるアシボソの学名を新たに定めて *M. vimineum* var. *polystachyum* f. *glabrum* Hiyama とする。なお朝鮮の済州島から報告された *P. imberbis* f. *glabriflora* Hack.（ハダカアシボソ——中井猛之進：済州島竝茫島植物調査報告書）はアシボソに外ならぬが裸名である。

ついでに，ウスゲアシボソと同じような毛を有するコブナグサの一型ジョウシュウコブナグサの学名を *Arthraxon hispidus* f. *monticola* Hiyama と改めておきたい。

Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus var. *polystachyum* (Fr. et Sav.) Ohwi in Acta Phytotax. Geobot. **11**: 156 (1942).

Pollinia japonica var. a. *polystachya* Fr. et Sav., Enum. Pl. Jap. **2**: 190 (1877).

forma **polystachyum**

Culms pubescent with delicate patent hairs in the upper part.——Nom. Jap. Usuge-ashiboso—Distr. Hondo.

forma **glabrum** Hiyama, nov. f.

Pollinia imberbis Nees forma *glabriflora* Hack. ex Nakai, Rep. Veg. Isl. Quelp. 15 (1914), nom. nud.

Culmi glabri. Forma communis.—Nom. Jap. Ashiboso—Distr. Japonia, etc.

Typus. Hondo: Tokyo, prov. Musashi (Hiyama, 1957—in herb. NSM).

Arthraxon hispidus (Thunb.) Makino forma **monticola** (Hiyama) Hiyama, stat, nov.

A. hispidus var. *monticola* Hiyama in Journ. Jap. Bot. **22**: 56 (1948).—Nom. Jap. Jōsyū-kobunagusa—Distr. Hondo.

正 誤（33 巻） **Errata** for Vol. 33 (1958)

Page	Line	誤 for	正 read
47	6	3-9 cm	3-9 mm